

Φλεγμονή και Οστεοπόρωση (www.myoskeletiko.com).

2014-04-25 18:22:23

Φλεγμονή και Οστεοπόρωση στις ηλικιωμένες γυναίκες (www.myoskeletiko.com).

Για να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ φλεγμονής και οστεοπορωτικών καταγμάτων ελέχθηκαν σε 1171 ηλικιωμένες γυναίκες, μέσης ηλικίας 80,1(+4,2 ετών), οι φλεγμονώδεις δείκτες όπως η Ιντερλευκίνη-6 και οι διαλυτοί υποδοχείς της Ιντερλευκίνης-6 και του Tumor Necrosis Factor (SR1 –SR2) και παρακολουθήθηκαν κατά μέσον όρο για 6,3 χρόνια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι λευκές γυναίκες με υψηλούς φλεγμονώδεις δείκτες έχουν αυξημένο κίνδυνο για οστεοπορωτικά κατάγματα που οφείλονται κατά τους ερευνητές, στη χαμηλή οστική μάζα που δημιουργεί η χρόνια φλεγμονή αλλά και στην παράλληλη χρόνια νεφρική υπολειτουργία συμβατή με την μεγάλη ηλικία.

Πηγή = Barbour KE1, Lui LY, Ensrud KE, Hillier TA, Leblanc ES, Ing SW, Hochberg MC, Cauley JA; for the Study of Osteoporotic Fractures (SOF) Research Group. Inflammatory Markers and Risk of Hip Fracture in Older White Women: The Study of Osteoporotic Fractures. J Bone Miner Res. 2014 Apr 9. doi: 10.1002/jbmr.2245. [Epub ahead of print].

Διαβάστε στο medReha το άρθρο πριν δημοσιευτεί εδώ:

[Inflammatory Markers and Risk of Hip Fracture in Older White Women The Study of](#)

□

Share / Save   